

# CONTRIBUTIONS A LA FAUNE INDO-CHINOISE

10<sup>e</sup> Mémoire (1)

## CURCULIONIDÆ, BRENTHIDÆ

Par J. FAUST

---

Séance du 11 novembre 1891

---

### CURCULIONIDÆ

1. BLOSIRUS ASELLUS Oliv., Fhr. Sch., V, p. 909.

Huê, Mytho, Saïgon.

2. BLOSIRUS HERTHUS Herbst, Käfer, VII, p. 64, tab. 98, fig. 14. — Boh., Sch., VIII, p. 401.

Mytho, Pnomh-Penh.

3. ASTYCUS LATERALIS F., Ent. Syst., II, p. 454.

Huê, Pnomh-Penh.

L'espèce varie pour la taille (8 à 15 mill.), la forme et la coloration. Les exemplaires ayant les côtés du thorax moins arrondis et les élytres acuminés constituent une variété : *subacuminatus* ; ceux dont les squames sont cuivreuses représentent probablement *A. rutilans* Oliv.

4. ESAMUS CIRCUNDATUS Wiedm., Germ. Mag., IV, p. 156.

Pnomh-Penh.

(1) Voir 1<sup>er</sup> mémoire (*Cicindelidae* et *Elateridae*, par Ed. Fleutiaux), Annales 1889, p. 137 ; — 2<sup>e</sup> mémoire (*Hydrocanthares*, par le Dr M. Régimbart), Annales 1889, p. 147 ; — 3<sup>e</sup> mémoire (*Carabidae*, par H.-W. Bates), Annales 1889, p. 261 ; — 4<sup>e</sup> mémoire (*Cryptocéphalides*, *Clytrides* et *Eumolpides*, par Éd. Lefèvre), Annales 1889, p. 287 ; — 5<sup>e</sup> mémoire (*Galerucidae* et *Alticidae*, par E. Allard), Annales 1889, p. 303 ; — 6<sup>e</sup> mémoire (*Sagrideae*, *Crioceridae*, *Chrysomelidae*, *Hispidae*, par le Dr J. Baly), Annales 1889, p. 485 ; — 7<sup>e</sup> mémoire (*Rhipidoceridae*, *Dascillidae*, *Malacodermidae*, par J. Bourgeois), Annales 1890, p. 161 ; — 8<sup>e</sup> mémoire (*Malacodermata*, *Cleridae*, *Lyctidae*, *Erotylidae*, *Endomychidae*, *Cassididae*, *Coccinellidae*, par H. S. Gorham), Annales 1891, p. 397 ; — 9<sup>e</sup> mémoire (*Buprestidae*, par J. R. H. Nervoort Van de Poll), Annales 1892, p. 17.

Ann. Soc. ent. Fr., 1892. — Avril 1893.

5. *CERCOPHORUS FISTULOSUS* Chevr., Ann. Soc. ent. Fr., 1880, p. 259.  
Pnomh-Penh.

6. *Hypomeces Fabricii*, n. sp. — *Angusto-oblongus, niger, concexus, squamis viridibus setisque cinereis immixtis dense obsitus, in utroque sexu albido-villosus; oculis rotundatis convexioribus; rostro magis conico, apice profunde triangulariter exciso, cum capite medio profunde sulcato, utrinque vadoso-biimpresso; prothorace latitudine fere æquilongo, conico, lateribus subrectis, ante angulos posticos aculos teriter sinuatis, margine antico post oculos nonnihil angulato-producto, basi bisinuato, dorso parum depresso, medio trisulcato, sulcis exterioribus vadosis, abbreviatis vel in punctis nonnullis dissolutis; elytris humeris oblique rotundatis, lateribus mox pone humeros rotundato-angulatis, apice rotundato-acuminatis, undique æqualiter ac densius seriatim punctatis; femoribus anticis maris minus incrassatis; tarsis, nonnunquam tibiis subroseo-micantibus; prosterno post coxas anticas bituberculato.* — Long. 11—13,5 mill.; lat. 4—5 mill.

Huê, Pnomh-Penh.

Ab H. squamoso F. forma angustiori, rostro magis attenuato, prothoracis lateribus non rotundatis, margine antico post oculos dentiformi producto, elytris fere ab humeris retrorsum attenuatis, punctis seriatim minus remotis, apicem versus haud obsoletioribus diversus.

7. *Hypomeces auricephalus*, n. sp. — H. squamoso F. similimus et affinis, sed haud villosus; etiam capite rostroque cupreo-squamosis, fronte latissima, rostro brevioris antrorsum valde attenuato, prothorace conico, lateribus rectis, margine antico post oculos angulato-producto, scapo antennarum crassiorum brevioris, tuberculo uno majore in prosterno post coxas anticas distinctus. — Long. 14,5 mill.; lat. 6 mill.

Saïgon, Pnomh-Penh.

Je n'ai vu que deux femelles. Le coloris cuivreux envahit en grande partie les pattes.

8. *Arhines hirtus*, n. sp. — *Oblongus, convexus, brunneus; pedibus femorum (medio aliquando excepto) dilutioribus, elytris pilis longis seriatim, capite prothoraceque brevioribus, brunneo-hirtis; fronte plana, rostro non latiore, foveola abbreviata impressa, cum rostro substrigosa; hoc latitudine parum longiore, apice triangulariter impresso, dorso plerumque obsoletissime canaliculato vel carinato; articulo primo funiculi secundo paulo longiore; prothorace antice posticeque angustato, lateribus*

*rotundato ac griseo-subsquamulato, dorso confertim sed inæqualiter punctato; scutello elytrorum sutura æquilato, quadrato, apice rotundato, tenuiter cinereo-pubescente; elytris prothoracis basi duplo latioribus ac sextuplo longioribus, humeris parum callosis, subrectangulatis (♀) vel obliquis (♂), lateribus parallelis, postice rotundato-angustatis, sutura mox ante apicem utrinque excisis, longitudinaliter paulo (♂) vel vix (♀) convexis, postice declivibus, basi prope callum humerale paulo impressis, dense punctato-striatis, interstitiis subplanis coriaceis, punctis raduliformibus vel granulis minutis et remotis seriatim obsitis, tenuissime pubescentibus squamisque commatis et piliformibus in mare viridialbis in femina cuprescentibus inæqualiter obsitis; femoribus subclavatis, pubescentibus, anticis dentatis; corpore subtus squamis lanceolatis et piliformibus subalbidis dense vestitis. — Long. 7 mill.; lat. 2,2 mill.*

♂. *Segmento anali apice obtuso bilobato.*

Saïgon.

Cette espèce se distingue de *A. frenatus* Fairm. et de *A. brunneus* Fst. par sa forme plus allongée et plus étroite, le pronotum plus long, l'écusson à côtés parallèles, l'échancrure profonde de la suture tout près de l'extrémité (comme chez certains *Macropterus*), par la vestiture squameuse et par les cuisses antérieures dentées.

**9. Myllocerus Fleutiauxi**, n. sp. — *Oblongo-ovatus, nigro-piceus, læte viridi-vittatus, brunneo-setosus; capite supra cum regione circiter oculos viridi-squamoso; fronte rostroque depressis, illa rostro haud luctiori abbreviatim canaliculata, hoc latitudine brevior, pterygiis dilatatis, dorso carina apice bifurcata, parte apicali nuda, postice carinula transversa terminata; oculis majoribus, convexis; scapo antennarum curvato, apicem versus nonnihil incrassato, articulis duobus primis funiculi elongatis, utroque 3°, 4°, 5° simul sumptis æquilongo; prothorace elongato-cylindrico, basi profunde bisinuato lobis tribus acutis æquilongis, ante basin utrinque transversim impresso, remote punctato, viridi-trivittato; scutello parvo nigro; elytris prothorace fere duplo latioribus, ellipticis, humeris oblique angulatis, dense punctato-substriatis, interstitiis subplanis, punctis remotis ac setis acuminatis nonnihil reclinatis seriatim obsitis, sutura, vitta lata submarginuli, pustulisque dispersis dorsalibus dense viridi-squamosis; pedibus brunneis, femoribus minute dentatis squamulis viridibus adpersis; corpore subtus lateraliter viridi-squamoso. — Long. 3,3—4,5 mill.; lat. 1,2—1,9 mill.*

Var. *supra æqualiter viridi-squamosus* . . . . . **æmulus.**

Cochinchine : Pnomh-Penh.

L'espèce nouvelle ne peut être confondue avec *M. lateralis* Chevr., qui a une coloration semblable, mais dont la base du thorax doit être coupée.

Chez la variété *emulus*, le thorax et les élytres sont dépourvus de bandes noires.

10. *CORIGETUS MANDARINUS* Fairm., Ann. Soc. ent. Fr., 1889, p. 367. Hué.

11. *CORIGETUS LIMBALIS* Fairm. (1), Ann. Soc. ent. Fr., 1889, p. 368. Hué.

12. *Corigetetus Dejeani*, n. sp. — *Oblongo-ovatus*, *niger*, *undique dense viridi-subsericeo-squamosus*, *brevissime setosus*; *oculis breviter ovatis*, *nonnihil convexis*; *capite quam rostro vix latiore cum fronte depresso*; *rostro latitudine parum longiore*, *pterygiis paulo dilatatis*, *apice impressione triangulari nuda profundissima et tenuiter elevato-marginata*, *remote punctato*, *obsolete tricarinato*; *antennis elongatis*; *scapo curvato*, *minus compresso*, *articulo 2° funiculi 1° parum*, *quam tribus sequentibus vix longiore sed quam clava elongata paulo brevior*; *prothorace transverso*, *conico*, *lateribus recto*, *basi sat profunde bisinuato*, *angulis posticis acutis*, *lobis ocularibus nullis*, *dorso longitudinaliter non convexo*, *sat remote punctato*; *scutello elytrisque ut in Corigeto ignaro Fst.*; *pedibus brevioribus*. — Long. 6,5—8,5 mill.; lat. 2—3 mill.

Saïgon.

Très voisin de *C. ignarus*; la nouvelle espèce se distingue de celui-ci par sa taille plus petite, par la tête plus petite, les yeux plus convexes, le thorax nullement arrondi latéralement, sans lobes oculaires et sans convexité sur le disque et enfin par les pattes beaucoup plus courtes.

13. *Corigetetus Fleutiauxi*, n. sp. — *Oblongus* (♂) *seu oblongo-ovatus* (♀), *squamis rotundatis convexis subtilis lateribusque albidis vel virescenti-albidis*, *dorso griseis et brunneis sat dense vestitus*, *rectinatim breviterque setosus*; *pedibus plerumque nigro-piceis*, *clava angusta antennarum testacea*; *rostro quam capite vix angustiore*, *latitudine nonnihil brevior* *cum fronte depressa remote punctato*, *antice obsolete tricarinato*, *apice triangulariter profundeque impresso*, *impressionem marginatam*; *oculis*

(1) Le thorax de cette espèce est armé, sur les côtés, tout près de la base, d'une épine très caractéristique; la description de *C. limbalis* correspond exactement à l'espèce de Hué, bien que l'auteur ne fasse pas mention de l'épine thoracique.

*subrotundatis, paulo convexis; antennis ut in præcedente sed articulis 2 primis æquilongis; prothorace conico, transverso, basi sinuato, lobo mediano rotundato, externo acuto, margine antico fere truncato, lateribus subrectis ante medium leviter sinuatis, sat remote punctato, vitta laterali plus (♂) minusve (♀) nigricante; scutello rotundato; elytris prothoracis basi nonnihil latioribus, latitudine plus quam duplo longioribus, humeris oblique rotundatis, lateribus parallelis, postice acuminato-rotundatis, dorso longitudinaliter vix convexis, apice declivibus, dense punctato-substriatis, interstitiis planis unicolori- (♀) seu brunneo-nebuloso- (♂) squamosis, subtriseriatim punctatis et setosis, setis valde reclinatis apice truncatis; femoribus nitidis parce pubescentibus, subtilis spina acuta armatis. — Long. 5—7 mill.; lat. 1,9—2,5 mill.*

Cochinchine : Saïgon, Tourane.

*Corigetus Fleutiauxi*, *Mylocerus transmarinus* Herbst et l'espèce suivante ont une coloration semblable.

**14. *Corigetus nebulosus*, n. sp. —** *Oblongo-oratus, nigro-piceus, subnitidus, griseo- seu ochraceo-squamosus; elytris brunneo-nebulosis; oculis ovatis, majoribus, vix convexis; rostro capite paulo angustiore, quadrato, tricarinato, ut fronte depressa et abbreviatim canaliculata remote punctato; antennis elongatis, articulis 2 primis funiculi subæqualibus, sequentibus brevioribus, æquilongis, 7° latitudine duplo longiore; prothorace conico, transverso, lateribus subrectis antice posticeque vix sinuatis, lobis ocularibus parum prominulis, angulis posticis quam lobo mediano brevioribus et paulo extus flexis; scutello majore quam sutura æquilato, apice rotundato; elytris fere ut in præcedente sed paulo latioribus, convexioribus, apice singulatim oblique truncatis, interstitiis convexis, setis longioribus et magis erectis, pustulis nebuloso-brunneis præsertim versus dimidium partem posticam marginis condensatis; femoribus spina acuta armatis. — Long. 6,3—8,5 mill.; lat. 2—3,2 mill.*

Hué.

Le rostre plus étroit, les yeux moins convexes, les angles postérieurs du thorax un peu saillants en dehors, les élytres plus larges avec les interstices convexes, distinguent *C. nebulosus* de *C. Fleutiauxi*, auquel il ressemble.

**15. *Corigetus figulus*, n. sp. —** *Elongato-ovalus, undique dense argillaceo- seu ochraceo-squamosus, setis brevibus fere adpressis parce obsitis; fronte parum convexa, quam rostro inter antennarum insertiones latiori, aliquando etiam vertice abbreviatim canaliculatu; oculis ovatis*

*subplanis; rostro longitudine latiore, supra longitudinaliter late impresso; scapo antennarum setosarum crasso basi ipse dilatato, compresso, parum curvato, quam funiculi crassiore; hoc clavam breviter ovatum ac acuminatum versus gradatim tenuiore, articulis 2 basilibus elongatis æquilongis, septimo atque ut reliquis quam primo dimidio brevioribus; prothorace transverso, basin bisinuatum versus parum latiore, fere cylindrico, lateribus subrectis, lobis ocularibus modicis, setis squamiformibus in punctis grossis remotisque obsito, ante basin utrinque impresso; scutello magno, rotundato; elytris latitudine plus quam duplo longioribus, humeris obliquis, obtuse angulatis, lateribus usque ad partem tertiam rectis parum divergentibus, postice rotundato-acuminatis, singulo apice obtuse angulato, longitudinaliter parum convexis, apice oblique declivibus, punctato-striatis, interstitiis modice convexis, setis adpressis subseriatim obsitis; femoribus minus incrassatis, spina minuta armatis. — Long. 6,2—10 mill.; lat. 2—3,2 mill.*

Saïgon, Qui-Nhon, Tourane.

Espèce remarquable par le scape épaissi à partir de la base et par le funicule s'amincissant graduellement vers la massue; celle-ci très courte et pas plus épaisse que le premier article du funicule.

16. *ONYCHOPOMA PARDA* Pasc., Journ. Linn. Soc., XI, p. 445, tab. x, fig. 8.

Saïgon.

Le bord antérieur du thorax est tronqué, mais garni d'une mèche de quelques longues soies derrière les yeux, comme chez le genre *Corigetus* Desbr., auprès duquel le genre *Onychopoma* doit être placé.

17. *CYPHICERUS DECORATUS* Fst., Stett. ent. Zeit., 1890, p. 49.

Saïgon, Pnomh-Penh, Tourane.

18. *Cyphicerus farinosus*, n. sp. — *Ovatus, convexus, niger, dense cretaceo-squamosus, parce setosus; oculis ovatis, subplanis; fronte plana, rostro non latiori; hoc elongato-quadrato, dorso late subimpresso et obsolete canaliculato, apice profunde triangulariter impresso; scrobibus basin rostri versus sinuato-divergentibus; scapo antennarum subrecto, apice vix incrassato, quam funiculo paulo crassiore, articulo secundo quam primo dimidio longiore; prothorace subquadrato cylindrico, basi sat profunde bisinuato, lobis ocularibus valde rotundatis; elytris antice prothoracis basi dimidio latioribus, humeris oblique angulatis, lateribus fere parallelis seu nonnihil divergentibus, apice acute (♂) vel sat*



*obtuse rotundatis, obsolete punctato-striatis, interstitiis subplanis, setis albidis reclinatis subseriatim obsitis; pedibus minus dense squamosis, femoribus haud clavatis, spina acuta armatis. — Long. 3,6—4,8 mill.; lat. 1,3—2 mill.*

Tourane (1).

19. **Heteroptochus** (2) **globulus** n. sp. — *Niger, valde convexus, dense ochraceo-squamosus, subalbido-signatus et fusco-setosus; oculis ovatis, subplanis; fronte latissima, plana, apice rostri æquilata; hoc latitudine vix brevior, cum capite continuato, paulo conico, obsolete abbreviatim tricarinato, apice triangulariter impresso, inter antennarum insertiones quam fronte fere dimidio angustiore; scapo setoso, nonnihil curvato, sensim incrassato, marginem anticum prothoracis attingente, articulo 1° funiculi 2° vix longiore, clava oblonga acuminata; prothorace valde transverso, basi leviter bisinuato, angulis posticis acutis retrorsum parum, lobis ocularibus latis, paulo productis, lateribus rotundatis, inæqualiter remoteque punctato, linea media utrinque vittula pallide ochraceo-seu subalbido signato; scutello parvo semicirculari squamoso; elytris subglobosis, apice subacuto-rotundatis, medio quam basi obtuse reflexo duplo latioribus, sat profunde punctato-striatis, interstitiis dorso magis convexis, setis suberectis longioribus obsitis, ochraceo-squamosis, singulo fasciis duabus transversis albidis, utrinque abbreviatis, una ante, altera post medium (hac minus perspicua) decoratis; femoribus squamosis, spina minuta armatis. — Long. 4 mill.; lat. 2 mill.*

Cochinchine : Pnomh-Penh.

20. **AMBLYRHINUS VIRIDANUS** Fst. (3), Stett. ent. Zeit., 1890, p. 74.

Saïgon.

21. **Amblyrhinus psittacinus**, n. sp. — *A. viridano* Fst. *similis et affinis; ab hoc antennis pedibusque crassioribus, capite rostroque latioribus, hoc evidentius carinato, prothoracis dorso convexo, angulis posticis spiniformibus lateraliter productis, elytris convexioribus, singulo apice breviter acuminatis, corpore supra etiam prosterno subtus toto, melu-*

(1) Je possède cette espèce depuis longtemps de Hong-Kong comme *C. farinosus* Dohrn (i. coll.).

(2) Trudy Russ. Ent. Obsch., 1887, p. 12.

(3) Ajouter à la diagnose : « *sterno subtus, elytrorum interstitiis duobus marginalibus pedibusque squamulis piliformibus cinereis valde remote obsitis.* »

*sterni et abdominis lateribus femoribusque densius viridi-squamosis, squamis aureis immixtis differt.* — Long. 6—6,5 mill.; lat. 2,4—2,8 mill.

Saïgon.

La suture et les interstices, chez *A. viridanus* et *A. psillacinus*, portent une série de poils blanchâtres courts.

22. *PHYTOSCAPHUS LIXABUNDUS* Boh., Sch., II, p. 642.

Saïgon, Hué.

23. *Phytoscapus annamensis*, n. sp. — *P. lixabundo* Boh. *similis, magis elongatus; antennis pedibusque longioribus; capite minore; prothorace immaculato, lateribus minus rotundato, lobis ocularibus minus rotundatis et magis productis; scutello rotundato, nudo; elytris apice rotundato-acuminatis, evidenter punctato-striatis, interstitiis convexioribus, uniseriatim setosis, unicolori- vel cinereo-squamosis et fasciis duabus obliquis, una postica albido-cincta, altera ante medium, etiam interstitiis 1° et 3° basi nigro-brunneis; femoribus anticis fortiter clavatis, omnibus dente parva acuto armatis, tibiis basin versus angulo dentiformi munitis.* — Long. 4,5—7,5 mill.; lat. 1,5—3 mill.

Hué, Tourane.

La bande postérieure oblique et obscure manque à *P. lixabundus* et l'antérieure est beaucoup plus étroite.

24. *LIXUS BINODULUS* (Illig.) Boh., Sch., III, p. 52.

Saïgon.

25. *LIXUS BRACHYRHINUS* Boh., Sch., VII, 1. p. 464.

Hué, Phnomh-Penh.

26. *NEOCLEONUS BIMACULATUS* Chev., Mém. Liège, V, p. 72 (*separat*).

Saïgon.

27. *XANTHOCHELUS SUPERCILIOSUS* Gyll., Sch., II, p. 202. — Flr., Sch., VI, 2, p. 59.

Saïgon.

28. *Actees juvenicus*, n. sp. — *Oblongus, nigro-piceus, subnitidus, sparsim silaceo-setosus; rostro longitudine tibiurarum anticearum, subarcuato, confertim punctato, basi profunde sulcato, sulco punctum profundum frontulem includente, inter antennarum insertiones canalicula impressa; oculis majoribus; antennis brevibus, articulis 2 primis æqui-*



*longis, ceteris transversis æquibrevibus; clava funiculi longitudine, articulo 1<sup>o</sup> quadrato. parte reliqua compacta et rotundato-acuminato quam primo sesquilongiore; prothorace quadrato, basi bisinuato, apice truncato, postice lateribus parallelo, antice rotundato-, intra apicem sinuato-angustato, basi lateribusque grosse rugoso-punctato, rugulis lateribus granulos parvos acutos efficientibus, disco antico sat remote punctato, punctis antice multo minoribus; scutello rotundato-triangulari minute punctulato; elytris latitudine duplo, prothorace paulo latioribus, lateribus subparallelis, humeris oblique rotundatis, dorso nonnihil depressis, sub callo postico obsolete impressis, postice punctato-sulcatis, antice seriatim foveatis, foveis quadratis approximatis, interstitiis antice angustis minute punctulatis, punctis foveisque selu silucea adpressa. Corpore subtus obsolete remoteque, abdomine apicem versus fortius et densius punctato. — Long. 9 mill.; lat. 3 mill.*

Mytho, 2 ♂ immatures.

Le rostre des mâles de toutes les espèces des *Actees* est barbu en dessous et les antennes sont insérées plus près de l'extrémité du rostre.

L'espèce nouvelle diffère de *A. cribratus* Gyll. principalement par le thorax plus court, les élytres beaucoup plus larges relativement au thorax, par les épaules non anguleuses, par les yeux plus larges, les antennes beaucoup plus courtes; de *A. porosus* Pasc., par le thorax nullement dilaté latéralement, par la massue beaucoup moins allongée; de l'un et de l'autre par la taille plus petite.

29. *ECHINOCNEMUS ADUSTUS* Chevr., Le Naturaliste, 1879, p. 117.

Mytho.

30. *CYLAS FORMICARIUS* Fabr., Ent. Syst., Suppl., p. 174, = *turcipennis* Boh., Sch., I, p. 369.

Cochinchine : Hué, Mytho.

31. ***Cylas rufipes***, n. sp. — *Elongatus, niger, nitidus; antennarum scapo elongato basi pedibusque, tarsis exceptis, rufis; oculis subconvexis; fronte cum rostro opacis; illa inter oculos tibiurum anticarum latitudine, impunctata, biimpressa, medio subcarinata; rostro crasso, elongato-quadrato, dorso usque ad antennarum insertionem longitudinaliter impresso, antico remote punctato; capite post orulos subconstricto; antennis tenuioribus, longioribus, articulis funiculi transversis, secundo reliquis parum longiore, clava maris funiculo toto, feminae articulis 5*

*ulimis æquilonga ; prothorace latitudine antico duplo longiore, postice tubulato, tubulo apice paulo constricto, laxe minuteque punctato, parte incrassata basi obsolete abbreviatim canaliculato ; elytris ab humeris angulato-subelevatis, ad marginem basalem sinuatis, antice prothoracis basi triplo latioribus, retrorsum paulo dilatatis, alte fornicatis, seriatim punctatis, seriebus multis irregularibus punctorum præsertim ad latera evidentioribus ; femoribus posticis corpore nonnihil superantibus. — Long. 3,3—4,6 mill.; lat. 1,2—1,5 mill.*

Cochinchine : Mytho.

32. *APION INDICUM* Mots., Étud. ent., 1858, p. 93.

Huê, Tourane.

33. *Apion versutum*, n. sp. — *Convexum, nigrum, opacum, parce albido-pilosum ; fronte fortiter punctata ; rostro (♀) longiore, cylindrico, arcuato, modice punctato, supra pone antenarum insertionem obsolete canaliculato et latere parum dilatato ; antennis subbasalibus ; prothorace latitudine non brevior, autorsum rotundato-angustato, basi subbisi-nuato, confertim punctato, ante basin foreola parva impressa ; elytris antice prothoracis basi nonnihil, in medio duplo latioribus, postice acuminato-rotundatis, longitudinaliter convexioribus, profunde punctato-striatis, interstitiis angustis, coriaceis, pilis albidis tenuioribus et crassioribus adpersis. his basi villus obsoletus, post medium fascium obsoletam efficientibus ; pedibus nigris aut infuscatis, unguiculis basi dentatis. — Long. 1,5 mill.*

Tourane.

Cette espèce diffère de *A. griseo-pubescens* Roelofs par le rostre de la femelle beaucoup plus long et dilaté à l'insertion des antennes, par la convexité des élytres et par le dessin (très peu remarquable) sur ceux-ci. Chez *A. strobilanthe* Desbr., avec un dessin semblable, les ongles sont simples, les antennes et les pattes sont d'un jaune clair, les élytres à épaules marquées et à intervalles plus larges que les stries.

34. *APION INFLATUM* Mots., Étud. ent., 1858, p. 91.

Les deux exemplaires de Huê ne diffèrent de *A. inflatum* (exemplaire provenant de l'auteur) que par les élytres un peu plus courts.

35. *Apion inscriptum*, n. sp. — *Elongato-oblongum, angustum, atrum, nitidum, pilis nonnullis albidis adpersum ; capite angusto, post oculos transversim impresso ; fronte late impressa ; oculis oblongis, parum convexis ; rostro femorum anticorum longitudine et latitudine, arcuato,*

pone antennarum insertionem obtuse ampliata, basi sparsim et evidenter, antice vix manifeste punctato; antennis submedianis crassioribus; prothorace subcylindrico, ad latera præsertim postice profunde impresso, medio nonnihil rotundato, basi subbisinuato, margine antico hunc emarginato, dorso longitudinaliter parum convexo, subtiliter laxè punctato, ante basin puncto impresso; scutello anguste ovato; elytris latitudine fere triplo longioribus, antice prothoracis basi nonnihil latioribus, humeris obliquis parum indicutis, medio subdilatis, apice rotundatis, dorso longitudinaliter convexis, obsolete subpunctato-striatis, stria suturali antice posticeque profunde impressa, interstitiis laxè vix conspicue punctatis; pedibus gracilibus, nitidis; unguiculis basi dentatis. — Long. 2 mill.

Cochinchine.

De la forme générale de *Lisotherium Hildebrandti* Fst. Le rostre de la femelle est un peu plus long que chez le mâle.

36. **Apion Jekeli**, n. sp. — A. amplipenni Mots. simile; nigrum, subnitidum; antennis, basi femorum 4 posticorum, pedibus anticis, genibus tarsisque testaceis; capite post oculos convexos fortiter punctato, late impresso; rostro femorum anticorum longitudine, arcuato, basi usque ad antennarum insertionem parum crassiore et modice punctato, tum ad apicem attenuato, glabro, nitido; antennis submedianis tenuibus; prothorace conico, latitudine vix longiore, basi subbisinuato, ante basin transversim paulo, ad latera antice posticeque sat profunde impresso, obsolete coriaceo, dorso punctis sat magnis sed rudosis obsito; scutello parvo triangulari; elytris brevibus, antice prothoracis basi multo latioribus, humeris oblique angulatis, lateribus fere parallelis, postice acuminato-rotundatis, subgibbosis, punctato-striatis, interstitiis subconvexis, obsolete coriaceis; corpore subtus ruguloso; pedibus mediocribus, unguiculis basi dentatis; coxis intermediis contiguis. — Long. 1,3 mill.

Mytho, 2 ♀.

A. *amplipenne* est de même forme et de même taille, mais tout à fait noir, le rostre plus long et plus arqué, le front biimpressionné et la pointe apicale des élytres largement arrondie.

37. **Nanophyes longirostris**, n. sp. — ♀. Oblongo-oratus, nigro-brunneus, nitidus, sat dense albido-pubescent; antennis, maxima parte pedum rufo-testaceis, tarsis obscurioribus; rostro corpore fere longiore, cylindrico, vix arcuato, nitido, impunctato; antennis medianis; articulis 2 basilibus funiculi æquilongis; oculis depressis; prothorace sub-

*transverso, conico, basi tenuiter reflexo, minute punctato, pube sat longa æqualiter obsito; elytris antice prothoracis basi non latioribus, humeris obtusissime rotundatis, retrorsum rotundato attenuatis, obsolete subpunctato-striatis, interstitiis subplanis, macula postbasali communi subcordiformi subnuda; femoribus nonnihil clavatis, subtus trispinosis, spina antica majori, dorso plus minusve nigrescentibus, unguiculis basi connatis.* — Long. 2—2.5 mill.

Pnomh-Penh.

Cette espèce nouvelle est remarquable par le rostre de la femelle extrêmement allongé et par la tache commune en forme de cœur presque dénudée.

38. *Apoderus* (*Hoplapoderus*) *Gemmosus* Jekel, Ins. Saund., II, p. 182, cum var. *Chevolati* Fst., Stett. ent. Zeit., 1891.

Pnomh-Penh.

39. *Apoderus bilineatus* Fst., Stett. ent. Zeit., 1883, p. 464.

Pnomh-Penh.

40. *Apoderus* (*Physapoderus*) *notatus* Fabr., Ent. Syst., I, 2, p. 385.

Var. *constans* Fst., Stett. ent. Zeit., 1883, p. 466. — *Dilutior, prothoracis etiam basi testacea.*

Var. *necopinus* Fst. — *Elytrorum interstitiis 2°, 3°, 4° et 5° ante apicem etiam testaceis.*

Pnomh-Penh.

41. *Trigonocolus* (*Megarhinus*) *brachmanæ* Fst., Stett. ent. Zeit., 1888, p. 300.

Pnomh-Penh.

42. *Alcides pectoralis* Boh., Sch., III, p. 618.

Saïgon.

43. *Bercthia Fairmairei*, n. sp. — *Oblonga, subdepressa, nigropicea, dense subsilaceo-squamosa, brunneo- et albido-maculata, setis spatuliformibus nigris et albidis obsita; antennis tarsisque ferrugineis; rostro femorum anticorum longitudine, arcuato, antice attenuato, toto (♂) vel basi tantum (♀) punctato-striato; articulo 2° funiculi 1° fere duplo longiore sed multo angustiore; prothorace latitudine æquilongo, antorsum rotundato-angustato, basi paulo bisinuato, margine antico subtruncato, lobis ocularibus rotundato-productis, dense punctato, ma-*

cula basali antice rotundata nigro-brunnea aliquando linea silacea divisa ornato; scutello parvo rotundato, silaceo-squamoso; elytris prothorace paulo latioribus, humeris rotundato-rectangulatis, parallelis, postice acute rotundatis, punctato-striatis, dorso depressis vitta lata communi a basi usque ad tertiam partem apicalem protensa nigro-brunnea postice littera V subalbida terminata, sutura interstitiisque alternis seriatim setosis; femoribus præsertim posticis nigro-brunneo bimaculatis; sterno dense punctato. — Long. 3,2—4,5 mill.; lat. 1—1,6 mill.

Huê.

44. *DESMIDOPHORUS CONFUCH* Boh., Sch., IV, p. 362.

Phnomh-Penh.

45. *BEROSIRIS VIOLATUS* Pasc., Journ. Linn. Soc., 1873, p. 44.

Saïgon, Mytho.

46. *TADIUS ERIRHINOIDES* Pasc., Ann. Mus. civ. Genova, 1883, p. 252.

Saïgon, Phnomh-Penh, Mytho.

### **Acallophilus**, nov. gen. Tylodinarum Lac.

A genere *Acalles* Sch. segmento abdominali secundo quam tertio et quarto simul sumptis æquilongo, femoribus tibiisque pluricarinatis, illis subtus sulcatis, articulis funiculi clavum versus sensim dilatatis, episternis metathoracis brevibus manifeste diversus.

47. **Acallophilus scrobicollis**, n. sp. — Breviter ovalis, convexus, niger, parce cinereo-albido-squamosus, setosus; antennis tarsisque ferrugineis; rostro femoribus anticis æquilongo et lato arcuato, grosse, apicem versus subtiliter punctato-striato; articulo 2° funiculi primo duplo longiore; prothorace latitudine vix longiore (♂) vel paulo brevior (♀), lateribus rotundato, antice magis quam postice angustato, margine antico sat profunde bisinuato, longitudinaliter parum convexo, ante apicem transversim subimpresso, dense scrobiculato, scrobiculis in fundo seta brevi instructis; scutello nullo; elytris breviter ovatis, antice prothorace non latioribus, dorso longitudinaliter nonnihil convexis, postice præsertim in mare citius declivibus, sulcis 9 impressis valde remote punctatis, interstitiis convexis uniserialiter granulatis, granulis parvis nitidis seta erecta parum claviformi instructis, maculis irregularibus sparsis ex squamis cinereo-albidis conspersis; femoribus æquilatis tibiisque rectis, inter carinas punctatis. — Long. 2,5—3,2 mill.; lat. 1,5—2 mill.

Tourane.

48. **Gasterocercus cristulatus**, n. sp. — Oblongo-ovatus, rufopiceus, siliceo-squamosus, nigro-cristatus; antennis rufis; capite conereo brunneo-setoso; oculis rotundatis; rostro basi quam fronte latiore, femorum anticorum longitudine, coarum intermediarum medium vix attingente, antrosum attenuato, arcuato, usque ad antennarum insertionem sat fortiter denseque punctato, carinato; antennis in medio rostri insertis, articulo 2° funiculi 1° longiore, clava articulis 5 ultimis simul sumptis æquilonga; prothorace transverso basi apiceque bisinuato, anterieus subito valde contractato, mox pone stricturem rotundato-ampliato, angulis posticis subobtusis, dorso medio longitudinaliter impresso, densissime siliceo-squamoso, tuberculis 6 [.: :.] ochraceis setosis instructo; scutello siliceo-rotundato; elytris anticis prothoracis basi nonnihil latioribus, latitudine plus quam duplo longioribus, humeris rotundatis, angulis anticis antrosum parum productis, postice angustatis, nonnihil convexis, sat grosse seriatim punctatis, punctis postice minoribus, interstitiis planis, brunneo-squamosis, antice plagis nonnullis siliceis variegatis, apice toto siliceo-squamosis, interstitio 1° cristis tribus, 3° et 4° tuberculo uno ex setis erectis nigris compositis notatis; pedibus dense cinereo-squamosis, femoribus posticis paulo, anticis vix incrassatis, omnibus dente parvo armatis; corpore subtus parce punctato et squamoso. — Long. 6—7 mill.; lat. 2—2,8 mill.

Tourane.

C'est la première espèce asiatique du genre *Gasterocercus*.

49. **Cryptorhynchus Olivieri**, n. sp. — ♂. Ovatus, niger, supra, prosterno pedibusque squamis nigris, cacaotinis flavisque dense, subtus squamis cinereis sparsim obsitus; rostro fronte inter oculos æquilato, tibiis anticis paulo brevioribus, arcuato, confertim punctato, basi cum capite cinereo-squamoso, setis crassis brevissimis adperso; antennis in tertia parte anteriore rostris insertis, articulis 2 primis funicali æquilongis; oculis rotundatis; prothorace transverso antrosum rotundato, valde angustato, basi modice, apice profunde bisinuato, lobo antiscutellari acute producto, punctis inæqualibus sat dense obsito, dorso albo-carinato utrinque tuberculo parvo ex setis atro-holosericeis; scutello rotundato albo-squamoso; elytris latitudine nonnihil longioribus, humeris obtuse angulatis, lateribus apicem versus rotundato-angulatis, dorso minus convexis postice oblique declivibus, punctato-striatis, punctis in striis grossis squama repletis, interstitiis dorsalibus alternis elevationibus ac serie granulorum squamosorum cacaotino-, vitta dorsali communi antice posticeque dilatata nigro-, vittaque latissima obliqua subhumerali a



*marginè usque ad striam secundam ducta flavo-squamosis; pedibus cinereo-squamosis, nigro-brunneo maculatis et breviter setosis; femoribus paulo incrassatis, dentatis; episternis metathoracis uniseriatim, metasterno abdomineque haud dense punctatis et squamosis. — Long. 7 mill.; lat. 3,8 mill.*

Saïgon, Pnomh-Penh.

De la forme générale du *C. mangiferæ* Fabr.; cependant les interstices alternes des élytres sont granuleux, presque tuberculeux, la fascie oblique jaune est très large et les deux premiers articles du funicule sont égaux. Comme chez *C. mangiferæ*, le rostre n'atteint pas le niveau postérieur des hanches intermédiaires.

50. **Mecysmoderes stigma**, n. sp. — *Rhomboidalis, supra subconvexa, picea, subtus dense flavo-albido supra pedibusque squamis piliformibus parce obsita; rostro antennisque ferrugineis; fronte inter oculos parum impressa, obsolete canaliculata; rostro dimidio corporis longiore, arcuato, basi tenuiter pluricarinato, punctato; articulo 3° funiculi 2° parum, 4°, 5°, 6° simul sumptis duplo longiore; prothorace antrosum valde, ante apicem sinuato-angustato, apice bisinuato, longitudinaliter convexo densissime punctato, undique carinato; elytris humeris oblique obtuseque angulatis, punctato-sulcalis, basi transversim depressis, interstitiis convexis, alternis nonnihil elevatioribus, macula basali suturali oblonga, atro-holosericea, postlice albo-terminata signatis; femoribus dentatis medio densius squamosis; pygidio confertim punctato. — Long. 3,3 mill.; lat. 2,2 mill.*

Pnom-Penh, 1 ♀ (Indes orient., 1 ♂, dans ma collection).

51. **Baris singularis**, n. sp. — *Oblonga, subdepressa, nigro-picea, opaca, squamis fluculis et albidis maculatim obsita; capite brunneo, antennis pedibusque rufis; capite globoso remote minuteque punctato; rostro a capite distincto, crasso femorum anticorum longitudine et latitudinè, arcuato, dense seriatim fortiterque punctato, latere subcarinato; articulo 1° funiculi elongato, reliquis clavam breviter ovatum versus dilatatis; prothorace latitudine æquilongo, basi apiceque nonnihil bisinuato, trapeziformi, latere ante apicem subito contracto, densissime punctato, flavidolate trivittato, vitta mediana carinula divisa; scutello rotundato, subsquamoso; elytris prothoracis basi parum latioribus, humeris vix indicatis, lateribus parum rotundatis, fere parallelis, in tertia parte apicali rotundato-angustatis, apice conjunctim fere truncatis, profundius striatis, interstitiis planis, coriaceis, subuniseriatim punctatis, punctis in dorso antico majoribus, pustula basali in interstitio 2° flavo-, macula*

*humerali, fascia communi postmediana utrinque striam quartam attingente suturaque subinterrupta albido-squamosis; pectore dense, abdomine remote punctato; prosterni medio, mesosterno lateribus, metasterno ac episternis dense, pedibus minus dense squamosis.* — Long. 2—3 mill.; lat. 0,9—1,2 mill.

Huê.

52. *CYRTOTRACHELUS DICHROUS* Fairm., Ann. Soc. ent. Fr., 1878, p. 273. Saïgon.

53. *Omotemnus Fleutiauxi*, n. sp. — *Elongato-ellipticus, rufus, supra velutinus; antennis, capite, rostro subtus, prothoracis margine antico pustulaque marginali, genibus tarsisque nigris; corpore subtus nitido, rufo, nigro-maculato* (♂), *vel nigro* (♀); *rostro basi trisulcato sat fortiter haud dense punctato, antice biseriatim tuberculato, apice lamina triangulari instructo* (♂), *vel 4-sulcato, sulcis rugulosis* (♀); *fronte paulo impressa; prothorace oblongo, lateribus postice parallelo, antice rotundato-angustato, apice nigro-tubulato, basi utrinque leviter bisinuato, dorso maris convexiore; scutello lanceolato, nitido, medio anguste velutino, rufo* (♂), *vel nigro* (♀); *elytris retrorsum nonnihil angustatis, humeris rotundatis, apice singulatim obtuso-rotundatis, quinquestriatis, striis basi profundioribus et punctatis, intersitiis subplanis; femoribus posticis maris basin versus haud dentatis; pygidio subconvexo, remote punctato, lateribus postice reflexis.* — Long. 28—34 mill.; lat. 10,5—12 mill.

Var. *Prothorace vittis duabus dorsalibus antice posticeque abbreviatis, elytris ante medium macula rotundata nigris*. . . . . **bisignatus.**

Saïgon.

54. *PROTOCERIUS MOLOSSUS* Oliv., Ent., V, p. 75, tab. 17, fig. 216.

Mytho.

55. *RYNCHOPHORUS PASCHA* Boh., var. **cinctus**, nov. — *Supra ruber; prothoracis fasciis duabus tridentatis medio junctis nigris, elytris pygidioque nigro-cinctis; abdomine maculis nonnullis, aliquando tibiis anticis medio rufis.*

Saïgon, Pnomh-Penh.

*R. rubrocinctus* Chevr., Ann. Soc. ent. Fr., 1883, p. 563, n'est probablement qu'une variété de *R. pascha* à élytres noirs, et chez laquelle le noir envahit le thorax, excepté la pointe et deux taches sur le dos.

56. ODOIPORUS (SPHENOPHORUS) LONGICOLLIS, var. PLANIPENNIS Gyll., Sch., IV, p. 911.

Huê.

57. *Sphenophorus argillaceus*, n. sp. — Oblongus, subdepressus, niger, indumento squamoso-argillaceo tectus; capite, prothoracis dorso, rostro, funiculo, scutello corporeque subtus in medio nigris; rostro basi incrassato, prothoracis longitudine, curvato, lateribus compresso, seriatim punctato; antennis basalibus; scapo recto, funiculo cum clava simul sumptis æquilongo, articulo 2° funiculi conico 1° longiore, 3°-6° transversis apice posticeque truncatis, 7° parum conico haud compresso 2° et 3° simul sumptis æquilongo; prothorace oblongo, basi angustissime marginato, evidenter, lateribus parum rotundatis, angulis posticis obtusis, ante apicem rotundato-contracto, remote punctato, punctis dorsalibus majoribus vadosis, argillaceis; scutello elongato; elytris prothorace nonnihil latioribus, basi tenuiter reflexis, humeris late rotundatis, retrorsum parum angustatis, apice singulatim rotundatis, post callo postico impressis, subpunctato-striatis, interstitiis alternis præsertim postice elevationibus ac obtuse obsoleteque interrupto-carinatis; pygidio aciculatim punctato medio longitudinaliter convexo et dense setoso; femoribus corporeque subtus irregulariter sed remote, tibiis dense seriatim punctatis, tarsis brevioribus, sublus spongiosis et setosis, articulo 3° triangulari dilatato, subtus basi in medio nudo. — Long. 9,5—11 mill.; lat. 3—3,5 mill.

Saïgon, Mytho.

Cette nouvelle espèce a le rostre comprimé, l'insertion des antennes et les hanches postérieures rapprochées comme les *Sphenophorus* pr. d. Elle se rapproche du groupe des *S. pertinax* Oliv. et *ochreus* Lec., à tarsi spongieux en dessous.

58. CALANDRA ORYZÆ Gyll., Sch., IV, p. 981.

Huê, Qui-Nhon, Tourane.

59. CALANDRA LINEARIS Herbst, Käf., VII, p. 5. — Gyll., Sch., IV, p. 979.

Cochinchine.

60. CALANDRA FRUMENTI Fabr., Syst. El., II, p. 438.

Mytho.

Chez l'un des exemplaires, les deux fascies transversales des élytres se confondent.

61. *CONARTHURUS TARSALIS* Woll., Trans. ent. Soc. Lond., 1873, p. 608. Saïgon.

62. ? *EUTORNUS CONGENER* Woll., Cist. ent., 1874, p. 206. Phomh-Penh.

**Macrocordylus**, nov. gen. Cossoninorum.

*Angustus, subcylindricus, antice posticeque attenuatus. Rostrum capite exserto angustius, elongatum. Scrobes sub oculos flexi subtus anguste distantes. Oculi late separati. Antennæ in rostri medio insertæ, scapo oculos vix superante, funiculo septem articulato, clava elongato-oblonga nonnihil compressa. Prothorax haud elongatus, basi subbisinuatus, antrosum angustatus. Scutellum parvum. Elytra prothoracis basi æquilata, postice attenuata. Pedes breviores tibiis apice extus unco curvato armatis, articulo 3° tarsorum apice bilobato, 4° cylindrico. Metasternum elongatum. Segmenta 2 prima abdominis coalita.*

Ce nouveau genre se place auprès du genre *Conarthrus* Woll.

63. **Macrocordylus Wollastoni**, n. sp. — *Elongatus, subcylindricus, rufo-brunneus, subopacus, calvus; fronte parum convexa, canalicula brevi instructa, cum rostro densissime punctata; hoc femoribus anticis brevior, arcuato, basi nonnihil depresso, ante antennarum insertionem parum dilatato; prothorace rotundato conico, apice quam basi duplo angustiore, basi subsinuato, angulis posticis acutis, minutissime coriaceo, opaco, dense fortiterque punctato; scutello parvo, rotundato; elytris prothorace non latioribus, lateribus usque ad tertiam partem posticam parallelis, tum rotundato- valde angustatis, apice singulatim subacuminatis, apice oblique basin parum marginatam versus breviter declivibus, seriatim punctatis, sutura toto, interstitiis alternis apice convexis, reliquis planis, omnibus rugulosis uni- vel irregulariter biseriatim punctatis, punctis quam illis in striis vix minoribus; corpore subtus nitidiore; metasterno abdomineque sparsim, prosterno densius punctatis.* — Long. 4 mill.; lat. 1 mill.

Hué.

**BRENTHIDÆ**

64. *CEROBATES TRISTRIATUS* Lund., Skrivt. af Nat. Selskab., V, 2, p. 66. — Gyll., Sch., I, p. 332.

Hué, Mytho.

